


**MINISTERIO DE SALUD
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**



**Unidad de Comunicación y Educación M.S.
San José, Costa Rica**

¿QUÉ ES EL SARAMPIÓN?

Es una enfermedad causada por un virus. Se puede presentar en cualquier edad y es muy contagiosa.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?

Los síntomas del sarampión son:

- ❖ Fiebre
- ❖ Tos
- ❖ Conjuntivitis
- ❖ Catarro
- ❖ Brote, parecido a un salpullido que se inicia en la cara y se distribuye por todo el cuerpo.



¡CUIDADO!

El sarampión puede presentar complicaciones como:

- Infección de oído
- Neumonía
- Diarrea
- Encefalitis

¿CÓMO SE TRANSMITE?

Cuando una persona enferma de sarampión respira, tose o estornuda, expulsa los virus al aire y de ahí pasan a otra persona.



MEDIDAS PARA EVITAR EL CONTAGIO

1. Lo más importante es estar vacunado. La vacuna se aplica a partir del año y tres meses de edad y un refuerzo al ingresar a la escuela.
2. Aislar a la persona enferma.
3. Evitar el contagio con enfermos de sarampión.



¿CÓMO TRATAR A UN ENFERMO DE SARAPIÓN?

No existe un tratamiento específico de esta enfermedad. Lo que se recomienda es tratar los síntomas y evitar complicaciones:

- Para evitar la deshidratación, el enfermo debe tomar bastantes líquidos.
- Para bajar la fiebre, tomar acetaminofén, según las indicaciones médicas. **NO USAR ASPIRINA.**
- En niños pequeños, mantener la lactancia materna.
- Guardar reposo.



Ante cualquier duda se debe consultar al establecimiento de salud más cercano

ESQUEMA BÁSICO DE VACUNACIÓN

NOMBRE DE LA VACUNA	PROTEGE CONTRA	VACUNACIÓN BÁSICA	REFUERZOS	VIA DE ADMINISTRACIÓN
BCG	Meningitis Tuberculosa	Recién nacido (a)	Ninguno	Intradérmico brazo izquierdo
HEPATITIS B	Hepatitis B	Recién nacido (a) 2 meses 6 meses	Ninguno	Intramuscular en el muslo
V.O.P. (POLIO ORAL)	Poliomielitis	2 meses 4 meses 6 meses	1 año y 3 meses	Oral
D.P.T. Difteria Pertusis Tétanos	Difteria Tosferina Tétano	2 meses 4 meses 6 meses	1 año 3 meses y 4 años	Intramuscular en el glúteo o muslo
S.R.P. Sarampión Rubéola Paperas	Sarampión Rubéola Paperas	1 año a 3 meses	Al ingresar a la escuela o a los 7 años.	Subcutánea en el brazo
D.T. Difteria Tétanos	Difteria Tétanos	Mayores de 6 años que no se le ha aplicado D.P.T.; 2 dosis a intervalos de 2 meses y 1 refuerzo a los 6 meses de la segunda dosis	A los 10 años y cada 10 años por toda la vida	Intramuscular en el brazo
Hib tipo b Haemophilus Influenzae tipo b	Meningitis, Neumonía y otras infecciones por Haemophilus influenzae	2 meses 4 meses 6 meses	1 año y 3 meses y 4 años	Intramuscular, en el muslo