


La viruela símica

¿Qué es la viruela símica?


La enfermedad es una zoonosis viral causada por el virus de la **Viruela Símica**. Un virus de la familia **Poxiviridae**, género **Orthopoxvirus**.

¿Cómo se transmite?




Animales silvestres:

Por contacto directo o indirecto con fluidos corporales, lesiones de piel o mucosas de animales silvestres infectados.



Personas:

por contacto estrecho con secreciones infectadas y gotículas de las vías respiratorias o lesiones de piel de una persona infectada, líquidos corporales o con objetos contaminados recientemente con los fluidos del paciente o materiales de la lesión: ropa de cama, vestimenta, utensilios para alimentación, toallas, dispositivos electrónicos y otros.




Transmisión vertical:

Se transmite de la madre al feto a través de la placenta.

Incubación y transmisión:


- Incubación de **6 a 13 días** posterior a la exposición (tiempos máximos de 5 a 21 días).
- La erupción generalmente comienza en el **primer o tercer día** del comienzo de la fiebre.
- Las lesiones pueden ser planas o ligeramente elevadas, llenas de líquido transparente o amarillento, para después formar costras, secarse y caerse.
- El número de lesiones en una persona varía entre unas pocas y varios miles.
- La erupción tiende a presentarse en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies.
- También se pueden encontrar en la boca, los genitales y los ojos.
Podrían no ser observables a simple vista.



La viruela símica

Signos y síntomas:

Los síntomas suelen durar entre **dos y cuatro semanas**. Si cree que sus síntomas podrían estar relacionados con la viruela del mono, contacte a su doctor inmediatamente.



Fiebre



Inflamación de ganglios



Dolor muscular



Dolor de cabeza



Dolor de espalda



Cansancio



Lesiones maculo-papulares y costras

Prevención y Recomendaciones:



Lave sus manos con frecuencia



Aplique el protocolo de estornudo y tos




No comparta alimentos, cubiertos y objetos de uso personal



Evite contacto con personas contagiadas o con síntomas y sus objetos personales



Limpie y desinfecte los espacios



Evite el contacto con animales silvestres o en cautiverio

¿A qué se expone una persona si tiene síntomas graves?

- Infecciones de la piel.
- Neumonía.
- Confusión.
- Infecciones oculares que pueden provocar pérdida de la visión.
- Correr el riesgo de sufrir síntomas más graves o morir por la enfermedad.

¿Qué grupos presentan un mayor riesgo por la viruela símica?

- Recién nacidos.
- Niños y niñas
- Personas con inmunodeficiencias.
- Mujeres embarazadas.

