

Aviso a los Lectores

II Congreso Centroamericano de Neurocirugía I Congreso Costarricense de Neurocirugía Curso Satélite de la Federación Mundial de Neurocirugía

10 al 16 de marzo del 2001

Hotel Meliá Cariari
San José, Costa Rica

Estimado(a) Colega:

En nombre del Comité Ejecutivo tengo el agrado de invitar a usted y su familia al II Congreso Centroamericano y al I Congreso Costarricense de Neurocirugía a celebrarse en San José, Costa Rica del 10 al 16 de marzo del 2001, evento científico más importante para los neurocirujanos del área centroamericana y de nuestro país, no sólo desde el punto de vista científico donde compartiremos nuestras experiencias y logros, sino que también creemos que es el momento oportuno de estrechar nuestros lazos de amistad y darnos a conocer ante el mundo neuroquirúrgico como agrupación que es capaz de realizar este tipo de actividades especialmente al inicio del tercer milenio, lo cual representa un reto para nuestra generación y un legado para las venideras.

El congreso iniciará el sábado 10 de marzo con Talleres Prácticos, sobre neuroendoscopia y cirugía de base de cráneo, continuando durante la semana con Conferencias Magistrales, Simposios y presentación de Trabajos Libres, para finalizar con un curso.

Dr. Jorge Badilla Corrales
Presidente

Presentación de Trabajos Libres:

Temas:

- Neurotraumatología y Cuidados Intensivos Neuroquirúrgicos
- Neurooncología
- Neurocirugía Pediátrica
- Neuroendoscopia

Informes a:

Dirección: www.diagnostico.com/neurocr
www.linemed.com/costarica/flanc

E-mail: jbadilla@sol.racsa.co.cr

Fax: (506) 240-4164 / 223-0950

☎ (506) 223-4579

✉ Apartado postal 1475- 1000 San José, Costa Rica

Nota Informativa

FDA actualiza las precauciones para la Cisaprida

La FDA informa a los profesionales de la salud y a los pacientes con nuevos datos importantes que incluyen recomendaciones en cuanto a la necesidad de desarrollar pruebas diagnósticas, que deben ser consideradas antes de cualquier uso de la Cisaprida. Las nuevas medidas están siendo recomendadas para ayudar a los médicos a evitar utilizar en pacientes en riesgo de sufrir raros –pero serios– eventos cardíacos asociados con la droga

Además, la FDA anuncia una reunión con un comité asesor público que se llevará a cabo el 12 de abril, donde se discutirá la seguridad de la droga y métodos adicionales para disminuir la ocurrencia de eventos adversos.

Mientras tanto, los pacientes que toman la droga se les sugiere consultar con sus médicos sobre la necesidad de realizarse las pruebas recomendadas y para saber si deben intentar otras opciones de tratamiento.

Actualmente, los esfuerzos están encaminados a continuar con los reportes de disritmias y muertes asociadas principalmente con el uso de la droga en personas que están, ya sea tomando cierta medicación o que tienen ciertas condiciones subyacentes conocidas como factores de riesgo. Un análisis reciente de reportes de eventos adversos (incluyendo 70 muertes) reveló que aproximadamente 85% de esos casos ocurrieron en pacientes con esos riesgos identificables.

Los etiquetados revisados también enlistan las drogas contraindicadas y las condiciones subyacentes que someten al paciente a un mayor riesgo. La Cisaprida no debe utilizarse en pacientes que toman alguno de los siguientes tipos de medicamentos: antialérgicos, antianginosos, antiarrítmicos (irregularidades del ritmo), antibióticos, antidepresivos, antifúngicos, antinausea, antisicóticos y los inhibidores de proteasa (anti-HIV).

Se advierte que los pacientes con alguna de las siguientes condiciones no deben tomar la droga: historia de irregularidades en el ritmo cardíaco, electrocardiograma anormal, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, enfermedad renal, niveles sanguíneos bajos de potasio, calcio o magnesio, problemas de alimentación (tales como bulimia o anorexia), deshidratación o vómito persistente.

Tomado del "FDA talk paper" fechado 24 de enero, 2000.