## Estudio de Mortalidad en las Mujeres por Cáncer y Otras Enfermedades en una Serie de Autopsias del Hospital San Juan de Dios


Alvaro Camacho F.\* Gonzalo Vargas Ch.\*\*

El presente trabajo tiene como finalidad efectuar una revisión del material de autopsias hechas en el LABORATORIO DE PATOLOGIA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, durante los últimos 10 años y presentar un análisis estadístico de la mortalidad por cáncer en la mujer así como de las enfermedades más importantes. Como fuente fundamental de información se utilizó los protocolos de las autopsias del Hospital San Juan de Dios durante el período comprendido entre enero de 1960 a diciembre de 1969 (10 años), éste número de autopsias se excluyeron los pacientes menores de 13 años, los mortinatos, las autopsias de tipo Médico Legal, así como todas aquellas autopsias con material incompleto para estudio histológico. Los resultados estadísticos obtenidos se resumen en los 3 cuadros adiuntos. Como se puede apreciar en el cuadro No. 2, entre los tumores malignos en la mujer, el primer lugar lo ocupa el cáncer del cérvix, con 117 casos (24.5%) y en orden decreciente, el carcinoma de estómago con 98 casos (20.6%), le continúa el carcinoma del pulmón con 38 casos (7.9%) y el carcinoma de la mama con 35 casos (7.3%).

Llama la atención la mayor frecuencia del carcinoma del pulmón con respecto al de la mama, debiendo considerarse estas cifras solamente en cuanto a mortalidad y no en cuanto a frecuencia, ya que sabemos que las posibilidades de sobrevida en pacientes con carcinomas de la mama sometidas a cirugía son muy superiores a los del carcinoma del pulmón y por lo tanto es muy posible que enfermas con carcinoma de la mama operadas hayan quedado curadas en su enfermedad. Los otros tumores malignos que le siguen son: el carcinoma de la vesícula biliar o de las vías biliares y el carcinoma de ovario con 29 casos (6.0 %), el

- Asistente del Servicio de Oncología, Hospital San Juan de Dios.
- Asistente del Servicio de Oncología, Hospital San Juan de Dios.

### TUMORES MALIGNOS MAS FRECUENTES EN LAS MUJERES



TUMORES MALICNOS MAS FRECUENTES EN LAS MUJERES POR GRUPOS DE EDADAS

				GRUPOS	P.O.S	3 (1	EDADES	SES	
TEMORES	TOTAL	13-13	50-29	90.39	<del>10-4</del> 9	20-28	69-09	70-79	80 arhos Y mass
Garcinoma del cérvix	111		•	16	3.8	27	2	-	•
Carcinoma del estómago	86	,	<b>+</b>	<b>~</b>	9	œ	52	8	-
Carcinoma del pulmón	38	1	ı	-	ψ	•	Ξ	**	**
Carcinoma de la mama	ş		N	9.	6	-	-	-	. 1
Carcinoma venicula y vias biliares	53	!	-		_	•	2	-	1
Carcinoma del ovario	29	-	•	_	+	=	<b>u</b>	P	_
Carcinoma del panereas	56		-	-	-	-	- 27		•
Carcinoma del culon y recto	23	,	- 1	. 1	•	~	. 4		-
Leucemia	23	-	9	•	~	-		1	•
Tumerer sistems nerviuso central	2	~	•	•	•	-		-	١
Linfomat	2	-		8	•	N	140	٠ ،	1
Carcinuma del higado	F.	_	_		. –	, ,	ı ve	,	_
Carcinoma del timides	2		1	~	-	•	•		-
Carcinoma del caótago	=	,	1	-	N		40	,	
Carcinuma del cuerpo uterino	=	ı	_	. 1	-	-	•	-	-
Сигюстствовы	ņ	ļ	~	•	~	. 1			. 1
Carcinoma origen primario desc.	<b>5</b> 1		1	_	-	7	24	-	2
Carcinoma cavidad bucal y faringe	•		;	- 1		-	~	-	٠-
Surcetta traidos blandus	9		,	*	- 1	-		. ,	. 1
Mickima müllipk	19		5	-	ı		. –	-	ı
Tumores de laringe	٠,		ı	_	,		-	٠ ١	ŀ
Meknama maligno	'n	1	ı		8	٠.	- 1	_	- 1
l'umores malignes del ritien	+	F	-	-	١.	_	,	-	1
l'umores ectropent une ales	•	-	1	-	ı	•	-	-	
Carcinoma de la piet	-		ı	•	_	~			-
Carcinoma intestino delpado	£		ı	_	-		_	1	
l'umores de la hipolitia	-		1	٥	, ,	1	-	:	1
Carcinoma de la valva	•		ı	: :	ı	-		٠	-
Carrinoma del chudente	. 2		1						-
Carinsma de la tráquea		ı			-		-	۱ :	ı
Furnores malignos del bueno	144	-	-	,	- 1	• 1	. 1	:	
Careinoma de la urerra	-	ı	ı		i	-	ı		
formers de la supezarenal	_	1				•	-		:
Historia	-	_	ı				ı		
TOTAL	\$7.5	2 €	15	99	*	130	85	¥.	R2

# CAUSAS MAS FREGUENTES DE DEFUNCION EN LAS MUJERES EN 7095 AUTOPSIAS

TUMORES	575	(19.4%)
CARDIOPATIAS	286	( 11.6 % )
OTRAS INFECCIONES:		
Meningitis   22	237	( 9.6 <b>%</b> )
INFECCIONES AGUDAS DEL APARATO RESPIRATORIO	204	( n.s % )
Neumopatías crónicas (excepto tuberculosis)	122	(-4.9 % )
Pielonefritis	121	{ 4.9 % }
Accidente vascular cerebral	102	( 4.1%)
Tuberculosis	161	(4.1%)
Deabetes Mellitus	87	( 3.5 % )
Desnutrición	86	( 3.5 % )
Aborto y complicaciones del embarazo y el parto	69	( 2.8 % )
Lesiones por agentes físicos y químicos	67	( 2.7 % )
Litizais biliar e infección de vías biliares	55	( 2.2 % )
Ulcera péptica	46	( 1.4 % )
Muertes operatorias  Enfermedades parasitarias	39 34	( 1.5 % ) ( 1.3 % )
Enfermedades de la sangre (excepto leucemia)	34 31	(1.2%)
Cirrosis hepática	30	(1.2%)
Oclusión intestinal	30	(1.2 %)
Otras enfermedades del sistema nervioso central	26	(1.0 %)
Hepatitis y necrosis hepatica	25	(1.0 %)
Infarto intestinal	21	(0.8 1)
Enfermedad tromboembolica	20	( 0.8 % )
Gangrena de miembros por oclasion vascular	18	( 0.7 % )
Enfermedad del culágeno	81	(0.7 %)
Necrosis tubular renal	11	( 0.4 % )
Pancreatitis aguda o crónica	11	( 0.4 % )
Enfermedades del tiroides ( excepto cáncer )	30	( 0.4 % )

malignos del hueso, carcinoma del duodeno, y de la tráquea y 1 caso (0.2%) en los tumores de la suprarrenal, histiocitosis, de la vejiga y de la uretra.

#### RESUMEN

Se revisaron los protocolos de las autopsias del Hospital San Juan de Dios, durante el período comprendido entre enero de 1960 a diciembre de 1969, en total se revisaron 7.095 autopsias. Es interesante notar que la causa más frecuente de defunción lo ocupan los tumores con el 19.4% y en segundo lugar las cardiopatías con el 11.6%. El cáncer de cérvix ocupa el primer lugar en causas de fallecimientos por cáncer con 117 casos, en segundo lugar el cáncer gástrico con 98 casos y el tercer lugar lo ocupa el cáncer de pulmón con 38 casos.

### BIBLIOGRAFIA

- 1 MENA, H.: Frecuencia del cáncer en Costa Rica. Acta Médica, Cost. 7 (1) 19-26; 1964.
- 2 MOYA, L.: El cáncer en Costa Rica. Un enfoque estadístico del problema. (Tesis de grado) Universidad de Costa Rica. 1969.
- 3 SALAS, J.: Enfermedades principales en un grupo de necropsias del Laboratorio de Patología del Hospital San Juan de Dios. Acta Médica Cost. 12 (1): 15-26, 1969.