

Lesiones no Venéreas de Organos¹ Genitales

Por

Dr. Eltrén Solano A.*

Dr. Néstor Zamora Q.**

INTRODUCCION

El objeto del presente trabajo es el de hacer, en favor del colega de medicina general, sobre todo del que tiene que ejercer en zonas rurales, en donde, no cuenta con el concurso del médico especializado para solicitar su consejo, o del laboratorio, para aclarar un diagnóstico, un resumen de las principales dermatosis de los órganos genitales y que no tienen etiología venérea. Estas lesiones se presentan a diario, en una consulta antivenérea, en un Hospital, en una Unidad Sanitaria y en el consultorio particular. Es en estas diferentes consultas, en donde hemos adquirido el material fotográfico que vamos a presentar.

GENERALIDADES

Teniendo el pene una cubierta cutánea, está expuesto a la mayoría de las enfermedades inflamatorias que afectan la piel en otras regiones del cuerpo, así como las que, por las características de la región, son más afines a ésta.

Las que con mayor frecuencia nos encontramos en nuestro medio son:

- Balanitis
- Balanopostitis
- Balanopostitis Flegmonosa
- Celulitis
- Dermatitis por contacto
- Urticarias
- Herpes Genital
- Molusco contagioso
- Psoriasis

¹ Trabajo presentado al Congreso Nacional de Medicina. San José, Costa Rica, noviembre 1965.

* Jefe de Clínica. Servicio de Dermatología. Profesor Cátedra de Dermatología. Escuela de Medicina. Universidad de Costa Rica.


** Egresado de la Escuela de Medicina. Universidad de Costa Rica

Leucoplasias
Carcinomas

Otras entidades que pueden presentarse, pero que sin embargo son muy poco vistas en nuestro ambiente son:

Balanopostitis diftérica
Vacuna
Diabetes
Sarna
Tuberculosis
Amibiasis
Histoplasmosis
Actinomicosis
Esporitricosis
Esclerodermas
Liquen plano
Elefantiasis linfangiectásica
Lupus eritematoso.

Picadura de garrapata






Liquen plano



Necrosis en paciente diabético



BALANITIS Y BALANOPOSTITIS

La balanitis consiste en una inflamación de la superficie epitelial del glande peniano; la postitis es una inflamación de la superficie mucosa del prepucio solo; como casi siempre están envueltos ambos elementos, más correctamente debería de llamarse Balanopostitis. Este cuadro tanto en sus formas agudas, como subaguda y crónica se presenta con la superficie del glande y del prepucio tumefacta, hiperémica, sensible y con prurito. Un exudado amarillento en la abertura prepucial, úlceras superficiales o excoriaciones de la mucosa del glande, son las características del proceso.

En individuos viejos, con Balanitis de larga duración, el epitelio puede engrosarse tomando un aspecto blanquecino (leucoplasia). En casos sumamente descuidados pueden presentarse complicaciones gangrenosas.

Desde el punto de vista etiológico la balanitis es la consecuencia de una hipersecreción de esmegma, en un glande que esté cubierto por el prepucio y en un paciente con malos hábitos de higiene. Hay factores predisponentes en los niños, como son la impregnación de orina, pañales húmedos, etc. En hombres seniles, la incontinencia.

Pero hay una serie de factores que son desencadenantes de este cuadro como son: trauma, contacto con secreciones vagina-

les infectantes (Tricomonas, monilias, bacterias), eritema multiforme o bien desórdenes metabólicos en los cuales la orina, que contiene sustancias irritantes, como azúcar, cantidades excesivas de uratos, oxalatos o sales amoniacales. En enfermedades tales como la diabetes, que provocan disminución en las defensas generales del enfermo.

Hemos colocado de primero en la lista y hemos dado gran importancia a la Balanopostitis por ser una condición no venérea cuya incidencia es enorme en nuestro medio, en donde un gran número de hombres no circuncidados, presentan fimosis, a veces extrema. En todos estos hombres, con balanopostitis, o no, recomendamos siempre la circuncisión como medida curativa o profiláctica y somos entusiastas de la costumbre hebrea, de circuncidar al recién nacido.



Balano postitis

BALANOPOSTITIS FLEGMOSA

Una variedad es la balanopostitis flemmosa, que suele ser causada por el estreptococo hemolítico y en la que el edema peniano es la aparición rápida, dando a veces lugar a verdaderos estrangulamientos del glande y con gran dolor del mismo.

CELULITIS


Puede ser causada por cualquier microorganismo piógeno. Se distingue de la erisipela en que afecta principalmente el tejido subcutáneo, pero en realidad ambos procesos son inseparables. La celulitis del pene se debe por lo general a la extensión de una infección primaria del prepucio. Si la inflamación es ligera consiste principalmente en edema, pero cuando es más intensa se observa una infiltración difusa con materia purulenta. Si la infección se hace crónica aparecen fibrosis y edema considerables, esta última complicación denominada pseudoelefantiasis.



Celulitis fimosis extremada

DERMATITIS POR CONTACTO

Con relativa frecuencia observamos esta entidad que se presenta en personas que abusan de las medidas higiénicas y que usan jabones irritantes, sulfurados y mercuriales, o que tal vez con fines profilácticos, después de relaciones sexuales, usan anti-sépticos como el mercurio cromo, el merthiolate, yodo, fenol, etc.



Dermatitis por contacto

ERITEMA POLIMORFO Y URTICARIA

Estas dos entidades suelen presentarse como respuesta alérgica a la ingestión de algunas drogas, como antipiréticos, analgésicos, antigripales, sulfas, antibióticos, etc. Las lesiones producidas son a veces confundibles con enfermedades venéreas y que al ser enormemente tratadas como tales logran exacerbar el estado existente.




Erupción pos medicamentos

P S O R I A S I S

Es otra de las dermatosis que frecuentemente afectan al pene y que se manifiesta por placas eritema-escamosas localizadas al glande o al resto del miembro, que no es dolorosa ni pruriginosa o apenas levemente pruriginosa y a veces fisuradas, húmedas e infectadas.

MOLUSCO CONTAGIOSO

Es esta una pequeña lesión papulosa, que a veces se presenta en el pene, generalmente en el dorso del mismo y aislados en pequeño número. Son de etiología vírica y cursan por lo general con presencia de los mismos en otras partes del cuerpo.



Molusco contagioso


LEUCOPLASIA

A veces se presenta como una complicación de la Balanopostitis aunque la etiología es en realidad desconocida. Se presenta en personas que han pasado de los 40 años. El glande aparece seco, blanquecino, con frecuencia rugoso. Hay placas esclerosadas, blancas en la cara interna del prepucio. Se considera una lesión precancerosa y es por ello necesario estar alerta para su tratamiento, en cuanto ésta es sospechada.

CARCINOMAS

No son rarísimos, ya que hemos tenido oportunidad de ver varios casos, de estas neoplasias, que cuando comienzan pueden ser confundibles con papilomas venéreos o condilomas acuminados.

En estudios realizados se ha encontrado que el porcentaje más alto de ellos se presentan en pacientes con fimosis.



Carcinoma de pene



Carcinoma

R E S U M E N

Se presenta un cuadro general y conciso de las dermatosis más frecuentes en nuestro medio que afectan a órganos genitales y, que sin ser de etiología venérea son fácilmente confundibles con enfermedades de esta índole.
