## Método Rîtmico Térmico.\* Evaluación de Resultados

Por

Pérez, A. Vela, P. Espinoza, J.

Desde 1962 funciona un Consultorio Externo de Regulación de la Natalidad en el Departamento de Obstetricia de la Universidad Catóólica de Chile. En él, se ha empleado exclusivamente como método anticonceptivo, el Método Rítmico Térmico. Este Consultorio funciona diariamente de Lunes a Sábado, durante 4 horas diarias. Es atendido exclusivamente por personal médico del Departamento y una matrona especialmente entrenada.

La mayor parte de las pacientes que solicitan atención en él, son madres cuyo parto ha sido atendido en este Departamento de Obstetricia; sin embargo la admisión es libre y puede concurrir cualquier mujer que lo solicite. La mayor parte de ellas pertenece a la clase media baja.

En el momento de su inscripción, se cita a la madre a una charla explicativa sobre todos los porcedimientos anticonceptivos disponibles en nuestro país, indicándoles donde pueden solicitarlos. Se les explica que este Consultorio usa sólo Método Rítmico y que ellas son libres de inscribirse o no.

Las madres que aceptan, son instruídas detalladamente sobre la forma de controlar la temperatura (bucalmente) el horario y modalidad de atención del centro; se les recomienda como períoda infértil los 8 primeros días del ciclo y desde el tercer día de producida el alza térmica.

La frecuencia de los controles varío entre 7 y 30 días, en ellos

\* Departamento de Obstetricia, Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile. se interpreta la curva térmica, indicándose el período de abstinencia sexual. En muchas pacientes se usó el moco cervical, la citología vaginal y la biopsia de endometrio como auxiliares diagnósticos del período de Jertilidad.

El presente informe resume nuestra experiencia desde el 1º de octubre de 1963 al 1º de lebrero de 1967.

Durante este período, solicitaron control de la Natalidad por Método Rítmico Térmico 627 parejas. De éstas, 193 (30,7%) rechazaron el método y 434 iniciaron sus controles en la forma ya explicada.

El análisis de los resultados, de acuerdo a la forma propuesta por Tietze (1), puede verse en las tablas I y II.

Aunque el número total de meses que incluye el presente estudio (1.382) no nos permite sacar conclusiones delinitivas cobre la efectividad del método. El Pregnancy Rate de esta población es el siguiente:

Al analizar los resultados vemos que el 30,7% de las parejas rechazaron el método una vez conocido. De los que aceptaron el método, sóloó el 32% lo usaron por más de tres meses y el 14.5% más de seis.

De las 627 parejas que incluye este estudio, en el momento del análisis permanecían activas 62 (10%).

El promedio de meses —uso— pareja fue de 3,1 con un rango de 0  $\sigma$  30.

Meses de uso	Activos	Emba- (	Cambio de método	Aban- dono		Total col. l a 5
0	]		12	69	_	82
1	17	15	14	59	·	105
2 3	16	12	10	22		60
	11.	7	10	19	1	48
4 5	2	11	3	14	1	31
5	4	6	2	8	),	21
€ 7	4	5	6	9	_	24
7	1	7	6	Ŗ	1	20
ß	3	2	2	4	<u> </u>	9
9	ĺ —	4	1	Ì	_	6
10	<u> </u>	3	2	1 3		
13	1	3	J ]	1	l <u> </u>	8 5
12	-	l —	n	2		2
13	_	1		ì	_	2
14	3		l — 1	-		2 3 2
15	_		1	1		2
16		2	1		<u> </u>	3
19		1 1				
20	_		1			1
30	1		_		_	] 1
		1				-

Tabla N° 2.—

METODO RITMICO TERMICO — CALCULO DEL "PREGNANCY
"RATE",

Meses de uso (1)	Nº de parejas (2)	Parejas-mezer de uso (1x2)	
0	82		1 _
Ī	105	105	15
2	60	120	12
3	48	144	7
4	31	124	11
5	2i	105	<b>5</b>
δ	24	144	5
7	20	140	7
8	9	72	2
9	6	54	1
16	8	80	3
11	5	55	3
12	2	24	1
13	2.	26	I
14	.3	<b>4</b> 2	<b>1</b> —
15	2	30	\
16	3	48	2
19	1	19	1
20	1	20	<b>—</b>
30	1	30	_
	434	1.382	79

## BIBLIOG RAFIA

1—TIETZE, CH., LEWIT, S.: Recommended Procedures for the study of use—effectiviness of Contraceptive Methods.

I P P F Medical Handbook, Part. 3, Medical Comittee of the I P P F. London, England.

Esta investigación ha sido parcialmente financiada por los Grants:

M—65—115 y M—67—30 del Population Council, New York.

Dirección de los autores: Casilla 114 — D Santiago de Chile.