

ECTOPIA URETERAL COMO CAUSA DE INCONTINENCIA URINARIA EN UNA MUJER ADULTA REPORTE DE UN CASO

Claudio R. Orlich Castelán*


Jorge Elizondo Cerdas**

ABSTRACTO

Se reporta el caso de una paciente de 24 años con historia de incontinencia urinaria desde su infancia en la cual el estudio urológico mostró una duplicación ureteral izquierda con un uretero ectópico del segmento superior.

Frecuentemente se describe el hallazgo de incontinencia urinaria en niñas con orificios ureterales ectópicos pero es sorprendente como algunas veces se hace este diagnóstico en la mujer adulta. Se ha descrito como síntoma clásico el goteo constante de orina junto con una micción normal y eso fue precisamente lo que en este caso nos hizo sospechar el diagnóstico.

Un pielograma venoso generalmente muestra la duplicación ureteral cuando queda tejido renal funcional en el segmento superior. En este caso podemos ver en las fotografías la duplicación con un segmento superior muy atrófico y se ve un uretero dilatado cerca de la vejiga al lado del uretero normal que drena al segmento inferior. Una cistografía miccional en este caso descartó la presencia de reflujo vesicoureteral. La paciente tenía un himen intacto y a pesar de que se buscó el uretero en vagina después de inyectar azul de metileno no fue posible encontrarlo. Una cistoscopia mostró un único orificio ureteral en el lado izquierdo y no se encontró un orificio ectópico en la uretra.



DeWeerd reportó el caso de una mujer con incontinencia urinaria y ectopia ureteral bilateral en la que se documentó la misma patología en la madre³ y Greene ha descrito el hallazgo de ureteros ectópicos en vagina durante el puerperio².

El tratamiento recomendado es la heminefrectomía del segmento superior con ureterectomía del uretero ectópico superior llegando tan distalmente como sea posible¹. Eso fue lo que hicimos en esta paciente y fue notorio como al día siguiente de la operación su problema de incontinencia urinaria había desaparecido.

RESUMEN

La duplicación ureteral con presencia de un uretero superior ectópico que termina distal al esfínter, ya sea en vagina, vulva, uretra o cuello vesical, es una causa rara de incontinencia urinaria en la mujer adulta. aquí nosotros reportamos un caso operado con éxito en el Servicio de Urología del Hospital San Juan de Dios.

BIBLIOGRAFIA

1. Culp, O.S.: Heminephroureterectomy: comparaisor of one stage and two stage operations. J. Urol 83:369-375, 1960.
2. Greene, L.F.: Ureteral ectopy in females. Clin Obstet. Gynecol 10:147-154, 1967.
3. DeWeerd, J. et al: Bilateral ureteral ectopia with urinary incontinence in a mother and daughter. J Urol. 98: 335-337, 1967.

* Asistente del Servicio de Urología. Hospital San Juan de Dios

** Jefe del Servicio de Hematología. Hospital San Juan de Dios.