FISTULAS ARTERIO VENOSAS PARA HEMODIALISIS

Antonio Houed Vega* Mario Rivera Mata** Rodolfo Alvarado Herrera*** Rodrigo Campos Rojas****

Los pacientes con insuficiencia renal crónica y Síndrome urémico, no tuvieron tratamiento médico hasta la década de los 40 en que Holck en Holanda y Alwal en Suecia desarrollaron un riñón artificial. En 1960 Quinton y Scribner describieron su técnica de fistula arteriovenosa externas con la colocación de tubo de Silastic en la arteria y vena correspondiente. En 1963 Shaldon y 3 colaboradores describieron su técnica de colocar cateteres por vía percutánea en la arteria y venas femorales. Poco tiempo después Brescia² y colaboradores publicaron su técnica de fistulas arteriovenosas internas, con anastomosis latero-lateral entre la arteria radial y una vena de la articulación de la muñeca. Posteriormente se desarrollaron diferentes técnicas, tanto para las fistulas arterio venosas como para las internas. Entre las modificaciones a las fistulas externas tenemos la variante de cateteres originales curvos, los rectos como las cánulas de Ramírez. En las internas se ha variado la anastomosis haciendo termino lateral de la vena a la arteria radial, y se ha interpuesto entre vena y arteria otros materiales tales como vena safena formando asas a nivel de brazos y piernas (muslos), arterias o carótidas de bovino (1972 - Chiritz),⁵ venas umbilicales y por último la prótesis de Gore-Tec (Polytebra Florestileno) en 1975 por Johnson, Baker y Williams.⁶

MATERIAL Y METODOS

Se revisan todos los casos de fistulas arterio Venosas internas y externas realizadas en el Hospital México desde 1º de Agosto 1972 hasta el 31 octubre 1979 (136 fistulas en total). Se incluyen todos los pacientes que están bajo el programa de transplante renal y aquellos casos agudos que: por intoxicación de drogas, mordeduras de serpiente o por alguna otra patología llegaron a la insuficiencia renal aguda. Analizamos nuestra experiencia en relación con los diferentes tipos de fistulas, material empleado, técnica, complicaciones, duración y la frecuencia de su uso.

RESULTADOS

Se practicaron un total de 136 fistulas arterio-venosas en 100 pacientes de los cuales 47 fueron parte del grupo de transplante renal, se les hizo un total de 62 fistulas arterio-venosas internas tipo Brescia,² evolucionando satisfactoriamente 50, 12 fallaron, las cuales fue-

ron en varios pacientes que tuvieron problema con este tipo de fistulas. A estos pacientes se les realizaron en varias ocasiones diferentes tipos de fistula arterio-venosa interna sin resultados positivos, razón por la cual se les colocaron cánulas o sea fistulas externas tipo Scribner temporalmente y luego se les colocaron prótesis de Gore-Tex con buenos resultados. Ver cuadro 1 y 2.

CUADRO 1

Total 136 fistula A.V. en 100 pacientes

CUADRO 2

Total 100 pacientes un total 136 fistulas

* Sección de Cirugía. Hospital México. C.S.S.S. San José Costa Rica.

TECNICA EMPLEADA

En todas las fistulas arterio-venosas tanto internas como externas se usó de primera intención el brazo opuesto al dominante del paciente. Se siguió la técnica de Brescia² para las internas en la mayoría de los casos y la de Quinton y Scribner para las externas. Aparte de estas técnicas, se inician las preconizadas por Dr. Cohn H. y Solit R.⁴ como el asa de safena o la interposición de segmentos cortos de vena safena entre las arterias y las venas de los brazos. También se empleó la técnica del Dr. Blanco C¹ y colaboradores de interponer o de usar una vena safena para la colocación de cánulas externas en la arteria y venas femorales. Por último se ha utilizado el Polytetrafluoroetileno o Gore-Tex en 4 pacientes con excelentes resultados. Se colocaron todas en el brazo izquierdo de la arteria humeral por encima del codo o la vena basilica en el surco bicipital. Tenemos entre nuestros pacientes, uno con prótesis de carótida de bovino (colocada en Estados Unidos) en el antebrazo; esta fistula lleva 6 meses de construida. Todas las fistulas se han hecho con anestesia local.

USO

Por lo general todos los pacientes se dializan de 2 a 3 veces por semana. Algunos pacientes se han dializado hasta 600 veces, debido a que no tienen un donador adecuado, o que tienen que esperar a que el donador más apropiado sea mayor de edad.

COMPLICACIONES

Se ha presentado infección en 2 casos

Ha habido sangrado espontáneo en 2 casos

De las 136 fistulas:

Se han obstruido 12 internas

Se han obstruido 23 externas

5 pacientes no han dado problema. La más reciente tiene 1 mes, la más antigua 6 meses.

CONSIDERACIONES GENERALES

Entre las fistulas fallidas debemos mencionar las hechas en pacientes cuyo lecho vascular era 46 tipo hipotrófico, factor que debió ser determinante en la obstrucción posterior. La selección del paciente y del material a usar en las fistulas no ha sido el óptimo, ya que no hemos contado más que con la vena safena, ausente en algunos pacientes y la mala calidad en otros. La decisión de usar fistulas externas estuvo en un buen número de casos, condicionada por el hecho de no contar con otro material. No contamos anteriormente con las cánulas rectas para fistulas externas, y ese fue factor determinante para que se perdieran algunas de ellas. En aras de la verdad consideramos que no se ha insistido suficientemente en el uso de la vena safena en nuestro medio, y que se han perdido algunas fistulas en las que la indicación primaria debió haber sido "interposición de un segmento de vena". No se ha contado con carótida de bovino, ni vena umbilical. En los últimos 3 meses se han implantado 4 prótesis de Gore-Tex, todas en pacientes

problemas. El tiempo que llevan estas prótesis funcionando es muy poco para sacar nuestras conclusiones, pero esta prótesis ha sido probada y reportada en muchos centros como una excelente alternativa. Podemos mencionar que las cuatro que se han implantado están permeables a pesar de que han sido usadas en casos problemas. No se ha notado Síndrome de robo en ninguna, y la única complicación ha sido edema discreto del miembro superior, que cedió con la elevación.

RESUMEN

Se revisa los expedientes de nuestros pacientes que por alguna razón han necesitado fistulas arterio-venosas para hemodiálisis, aguda o crónica. Se evalúan su permeabilidad en relación con los diferentes tipos de fistulas, la técnica quirúrgica usada y el material empleado. Se incluyen los pacientes agudos y los de transplante renal del Servicio de Hemodiálisis del Hospital México. Las fistulas se han practicado únicamente en los pacientes que van a ser transplantados, (fistula de Brescia²) Si esta fue fallida se practica una externa temporalmente y luego se interpone entre arteria y venas una prótesis de arterio-bovino; en los últimos 4 casos, con excelente resultado a corto plazo, usando una prótesis de Gore-Tex. Los pacientes agudos siempre han tenido fistulas externas en el brazo no dominante. Se ha tratado últimamente de usar solo fistulas de Ramírez, o sea con tubos rectos, mucho más fáciles de permeabilizar si se obstruyen. Fue necesario en algunos casos, usar fistulas externas a nivel de tobillo (safena tibial posterior). En un caso la fistula se hizo en muslo entre la safena y la arteria femoral superficial, con cánula exterior.

BIBLIOGRAFIA

1. Blanco C y cols. Colocación de cánulas en arterias y venas femorales con interposición de safena. Trabajo presentado en Mar del Plata, Argentina Nov. 1975, en Congreso de Angiología y Cirugía Cardiovascular.
2. Brescia, N. *New Eng. Journal of Medicine*. 275-1089 1966.
3. Campos R. Fistulas A.V. internas y externas para hemodiálisis en pacientes con enfermedad renal terminal. Trabajo presentado en Congreso Médico Nacional en Costa Rica 1973.
4. Cohn, H y Solit R. Fistulas A.V. para hemodiálisis prolongada. *Clinicas quirúrgicas de Norteamérica*. Volumen 53 (#3):673-685, junio 1973. Editorial etc.
5. Chivitz, JR-Bower R, Self sealing prothesis for arteriovenous fistula in man. *Trans am Soc. Artif. Intern Organs* 18:452, 1972.
6. Johnson JN, Baker 2 D, Williams T. Expander polytetrafluoroethylene: A Subcutaneous conduit for hemodialysis. *Dial and Trnspl.* april 1976.
7. Quinton W, Dillard D y Scribner B. *Trans. Amer Soc. Artif, Int, Organs* 6:104, 1960.