

— ACTUALIDADES —

Tratamiento de la Cromoblastomycosis con Calciferol

(A. M. A. Archives of Dermatology and Syphilology
Nov. 1954 Vol. 70 pp. 665-667).

El autor, el Dr. E. Bonilla (Costa Rica) presenta tres casos de Cromoblastomycosis que ha tratado con grandes dosis de Calciferol con éxito y en los cuales otros tratamientos anteriores fracasaron. A uno de estos pacientes se administró una solución de IK por vía oral a más del calciferol. Esta combinación dio buenos resultados en otros tres casos. No observó acción tóxica alguna.

J. Z.

METILANDROSTENEDIOL en el tratamiento paliativo del cáncer del pecho

(J. A. M. A. 148:1212, 1952)

Los Drs. S. C. Kasdon, W. H. Fishman, Ph. D., R. M. Dart, C. D. Bonner y F. Homburger, de Boston, estudian varios casos que han tratado con esteroides, llegando a las siguientes conclusiones:

"Cuarenta y cuatro pacientes con cáncer avanzado del pecho recibieron, en varios periodos y por diversas vías de administración, Metilandrostenediol; 14 pacientes no mostraron mejoría alguna atribuible a esta terapia. 30 pacientes denotaron mejoría evidenciada por criterio objetivo. Las cantidades de testosterona necesarias para producir semejantes efectos beneficiosos en este grupo, podrían ocasionar severo hirsutismo, acné, cambios de la voz y virilización en muchos de ellos. Sin embargo solo efectos secundarios sin importancia se observaron con metilandrostenediol, excepto hipercalcemia en pacientes con lesiones extensas osteolíticas".

J. Z.