

Primer Caso de Gestación Ectópica en Costa Rica

Por

Dr. Oscar Hidalgo M. *

G. A. A., ingresó el 19 de febrero de 1963 y salió el 27 de marzo del mismo año, 22 años, raza negra, se dedica al comercio sexual. Nuligesta. Alcoholismo y tabaquismo moderados.

Reliere que su última regla fue el 4 de diciembre. El 16 de enero inició sangramiento genital moderado que ha continuado. Se presenta con temperatura de 37.5, tensión arterial 140-80, y a la exploración muestra tumoración hipogástrica poco dolorosa que parece corresponder a útero. El 21 de enero continúa el leve sangrado y el Galli Mainini se reporta positivo. Por sospecharse mola hidatiforme se solicita un Galli Mainini cuantitativo, que da positivo a 50% de orina y 50% de agua destilada. Entonces se practica legrado uterino que no muestra evidencia de gestación. Otro Galli del 25 de febrero es positivo con 10% de orina y 90% de agua destilada, lo que hace sospechar mola invasiva, y por lo cual se decide hacer un segundo curetaje, en el cual nuevamente se encontró el útero vacío; y en la misma sesión operatoria se efectúa laparotomía que da hallazgo de salpin izquierdo roto conteniendo dos productos. La pieza operatoria se remitió al patólogo, y el informe ratificó: Embarazo tubario gemelar.

* Jefe del Servicio de Cirugía Hospital San Rafael.
